

くすりのしおり

注射剤

2016年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名: アリクストラ皮下注 7.5mg

主成分: フォンダパリヌクスナトリウム (Fondaparinux sodium)

剤形: 注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

血液凝固第 Xa 因子を選択的に阻害することで、血栓形成を抑制します。
通常、急性肺血栓塞栓症、急性深部静脈血栓症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。出血している（後腹膜出血、頭蓋内出血、脊椎内出血など）。急性細菌性心内膜炎がある。腎障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> : 医療担当者記入 >>
- ・ 通常、1日1回、皮下に注射します。
- ・ 具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、出血、肝機能障害、発疹、貧血、凝固障害などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 皮下出血、腹痛、頭痛 [出血]
- ・ 皮膚や結膜などの黄染（黄色くなる） [肝機能障害、黄疸]
- ・ 顔色が青い、冷汗、蕁麻疹 [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。